

Thématique	Synthèse	Sources / Supports d'information
<p><b>Point épidémiologique</b></p>	<p>17 nouveaux cas dans la journée du 10 mars dans la journée du 10 mars, soit 72 cas confirmés de Coronavirus Nouvelle-Aquitaine au 10 mars 12h00 : Lot-Et-Garonne : <i>augmentation du nombre de cas en lien avec le rassemblement de Mulhouse.</i></p> <p><b>Plus de publication d'un point quotidien sur le site de l'ARS.</b></p>	<p>Point presse gouvernement : <a href="https://www.dailymotion.com/MinSoliSante">https://www.dailymotion.com/MinSoliSante</a>  <a href="https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir">https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir</a></p>
<p><b>Mode de contamination</b></p>	<p>Contamination par gouttelettes plutôt qu'aérienne. ↳ 1<sup>er</sup> vecteur de contamination se fait par les mains. Le virus reste actif 3 heures sur surface sèche.</p>	
<p><b>Information des patients et Prévention</b></p>	<p>Information : Mode de transmission et symptomatologie Prévention : Les masques ne sont pas la solution pour la population générale : ↳ Les gestes simples sont efficaces : « <i>lavage des mains, mouchoirs à usage unique immédiatement jetés, se saluer [plutôt que se serrer la main]</i> »</p> <p><b>N° vert national : 08 00 13 00 00 : plateforme d'information non médicale</b></p>	<p><a href="https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/infographie_coronavirus.pdf">https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/infographie_coronavirus.pdf</a>  <a href="https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public">https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public</a>  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BrVMCgsk2PY&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=BrVMCgsk2PY&amp;feature=youtu.be</a>  Idées reçues : <a href="https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters">https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters</a></p>

<p><b>Recommandation port du masque chirurgical</b></p>	<p><b>Personnes présentant des signes d'infection respiratoire et ORL</b> au cours des soins et des consultations. Masque fourni par le professionnel de santé.</p> <p><b>Professionnels de santé :</b></p> <p><b>Sages-femmes et préparateurs en pharmacie</b> pourront utiliser des masques chirurgicaux tout au long de la journée.</p> <p><b>Masseurs-kinésithérapeutes</b> pour les activités de kinésithérapie respiratoire et celle indispensable au maintien à domicile.</p> <p><b>Chirurgiens-dentistes</b> pour les soins prioritaires assurés.</p> <p><b>EHPAD et les structures médico-sociales :</b> dès l'apparition de symptômes identification d'un secteur dédié pour la prise en charge des résidents atteints du COVID 19. Au sein de ces secteurs : mise à disposition de masques pour le personnel.</p> <p><b>Services d'aides ou de soins à domicile :</b> mise à disposition de masques chirurgicaux pour assurer les visites à domicile.</p> <p>Prestataires de services et distributeurs de matériel pour assurer les interventions auprès des patients les plus grave,</p> <p><b>Transporteurs sanitaires et les centres de secours</b> pour les transports de cas possibles ou confirmés.</p>	<p><a href="https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_covid-19-strategie_de_gestion_et_d_utilisation_d_es_masques_de_protection.pdf">https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_covid-19-strategie_de_gestion_et_d_utilisation_d_es_masques_de_protection.pdf</a></p>
<p><b>Recommandation port du masque chirurgical ou FFP2</b></p>	<p><b>médecin, infirmier, pharmacien pour couvrir l'amplitude de la journée.</b></p> <p><i>Port d'un masque FFP2 selon leur disponibilité.</i></p>	

<p><b>Distribution de masques pour les professionnels de santé libéraux</b></p>	<p><b>Par les pharmacies d'officine :</b> livraison à chaque officine un minimum de 10 boîtes de 50 masques chirurgicaux issus du stock national.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Identification par 1 étiquette « stock Etat ».</li> </ul> <p>Envoi aux professionnels concernés d'un message les invitant à retirer 1 boîte de 50 masques chirurgicaux de ce stock Etat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Présentation de la carte professionnelle sur laquelle figure son numéro RPPS.</li> </ul> <p>De nouveaux approvisionnements issus du stock Etat pourront être assurés en fonction des besoins.</p>	<p><a href="https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do?id=30350&amp;cmd=visualiserMessage">https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do?id=30350&amp;cmd=visualiserMessage</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ L'utilisation de ces masques est décrite dans le document nommé « Consignes d'utilisation des masques issus du stock Etat par les Professionnels de Santé »</li> </ul>
<p><b>Recommandation port du masque FFP2</b></p>	<p><b>aux personnels soignants réalisant des soins critiques / urgents, des gestes médicaux invasifs ou des manœuvres au niveau de la sphère respiratoire.</b></p>	<p><a href="https://www.sf2h.net/publications/coronavirus-2019-ncov">https://www.sf2h.net/publications/coronavirus-2019-ncov</a>  <a href="https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/emploi_des_masques.pdf">https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/emploi_des_masques.pdf</a></p>
<p><b>Soins non urgents</b></p>	<p><b>Pour les patients les plus fragiles,</b> et notamment les plus de 70 ans, il est demandé à certains professionnels de reporter les soins non-urgents pour ces personnes afin d'éviter les sorties, les salles d'attente. Sont concernés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pédicures-podologues,</li> <li>✓ Orthophonistes,</li> <li>✓ Orthoptistes,</li> <li>✓ Audioprothésistes,</li> <li>✓ masseurs-kinésithérapeutes.</li> </ul>	<p><a href="https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do?jsessionid=B7D91EB9C86AB4022B5B869DA02456CD.du-dgsurgentc?id=30500&amp;cmd=visualiserMessage">https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do?jsessionid=B7D91EB9C86AB4022B5B869DA02456CD.du-dgsurgentc?id=30500&amp;cmd=visualiserMessage</a></p>
<p><b>Gradation du risque :</b>  <i>Mise à jour 15/03/2020</i></p>	<p><b>Cas possible :</b>  Toute personne présentant des <b>signes cliniques d'infection respiratoire aiguë avec une fièvre ou une sensation de fièvre, ET</b>  Ayant voyagé ou séjourné dans une <b>zone d'exposition à risque dans les 14 jours précédant la date de début des signes cliniques.</b> Au cas par cas une exposition</p>	<p>Conduite à tenir et zones d'exposition :  <a href="https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-">https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-</a></p>

	<p>avérée ou potentielle à un évènement de type cluster hors des zones d'exposition à risque, pourra aussi être considérée.</p> <p><b>Toute personne</b>, même sans notion de voyage/séjour dans une zone d'exposition à risque ou de contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19,</p> <p><b>Présentant :</b></p> <p><b>Une pneumonie pour laquelle une autre étiologie a été préalablement exclue</b> sur la base de critères cliniques, radiologiques et/ou virologiques <b>et dont l'état clinique nécessite une hospitalisation, OU</b></p> <p><b>Des signes de détresse respiratoire aiguë pouvant aller jusqu'au SDRA dans un contexte possiblement viral</b> et sans autre étiologie évidente d'emblée.</p> <p><b>Cas probable :</b></p> <p>Toute personne présentant des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë dans les 14 jours suivant un contact étroit* avec un cas confirmé de COVID-19 ;</p> <p>*Un <b>contact étroit</b> est une personne qui, à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé, a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ partagé le même lieu de vie,</li> <li>✓ eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion,</li> <li>✓ flirt ; amis intimes,</li> <li>✓ voisins de classe ou de bureau,</li> <li>✓ voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée,</li> <li>✓ personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection adéquats.</li> </ul> <p><b>Cas confirmé</b></p> <p>Toute personne, symptomatique ou non, avec un prélèvement confirmant l'infection par le SARS-CoV-2.</p>	<p><a href="#">coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde</a></p>
<p><b>Conduites à tenir</b></p>	<p><b>Cas possibles et probables</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Quatorzaine stricte à domicile</li> </ul>	<p><a href="https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-">https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-</a></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Auto-surveillance de la température matin et soir pendant les 14 jours qui suivent le dernier contact (durée d'incubation maximale de la maladie),</li> <li>↪ Port du masque chirurgical en cas de contacts inévitables</li> <li>↪ La date de fin de suivi déterminée par le professionnel de santé en charge du suivi,</li> <li>↪ Suivi quotidien par une équipe de professionnels de santé, par téléphone, pendant les 14 jours suivant le possible dernier contact avec le patient malade.</li> </ul> <p><b>Repérage :</b>  <a href="https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/20200229-covid19-fichesoignants29fev.pdf">https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/20200229-covid19-fichesoignants29fev.pdf</a></p> <p><b>Questionnaires et recommandations :</b>  <a href="https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde">https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde</a></p>	<p><a href="https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/conduite_a_tenir_medecins_liberaux.pdf">https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/conduite_a_tenir_medecins_liberaux.pdf</a></p> <p><a href="https://www.coreb.infectiologie.com/fr/alertes-infos/covid-19_-n.html">https://www.coreb.infectiologie.com/fr/alertes-infos/covid-19_-n.html</a></p> <p>Etablissements de soins habilités COVID-19 :  <a href="https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/esh-covid-19-ars-coreb-25fev20.pdf">https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/esh-covid-19-ars-coreb-25fev20.pdf</a></p>
<p><b>Personnes à risque de développer une forme grave d'infection</b></p>	<p>Selon le Haut Comité de Santé Publique il s'agit des :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Personnes âgées de 70 ans et plus</b> (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés de façon plus rapprochée) ;</li> <li>✓ <b>Patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV</b></li> <li>✓ <b>Patients atteints de cirrhose au stade B</b> au moins</li> <li>✓ <b>Patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires</b> : hypertension artérielle compliquée, ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;</li> </ul>	<p><a href="https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles">https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles</a></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Diabétiques insulino-dépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires</b> à leur pathologie ;</li> <li>✓ <b>Personnes présentant une pathologie chronique respiratoire</b> susceptible de décompenser lors d'une infection virale ;</li> <li>✓ <b>Personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Médicamenteuses</b> : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive,</li> <li>○ <b>Infection à VIH non contrôlé</b> avec des CD4 &lt;200/mn<sup>3</sup></li> <li>○ <b>Consécutives à une greffe d'organe solide ou de cellules souches</b> hématopoïétiques,</li> <li>○ <b>Atteint d'hémopathie maligne</b> en cours de traitement,</li> <li>○ <b>Présentant un cancer métastaté.</b></li> </ul> </li> </ul> <p>Les femmes enceintes par analogie avec les séries publiées sur le MERS-CoV et le SRAS en dépit d'une petite série de 18 cas d'infections à SARS-CoV-2 ne montrant pas de sur-risque ni pour la mère ni pour l'enfant ;</p> <p>• Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle &gt; 40kg/m<sup>2</sup> : par analogie avec la grippe A(H1N1))</p>	
<p><b>Priorisation des tests de diagnostic</b></p>	<p>Pour les personnes symptomatiques ou l'ayant été. <b>Critères de priorité :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gravité des symptômes,</li> <li>✓ Personnels de santé avec symptômes évocateurs</li> <li>✓ Comorbidité pour les personnes à risques de formes graves</li> <li>✓ Femmes enceintes symptomatiques</li> <li>✓ Patient hospitalisé pour une autre cause devenant symptomatique</li> <li>✓ Donneurs d'organes, tissus ou de cellules souches</li> <li>✓ Exploration d'un foyer de cas possibles.</li> </ul>	<p><a href="https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/hcsp_sars-cov2-priorisationtestsdiagnostiques-2020-03-11-2.pdf">https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/hcsp_sars-cov2-priorisationtestsdiagnostiques-2020-03-11-2.pdf</a></p>

<b>Arrêt de travail</b>	Pour les parents d'enfants : <b>démarches par l'employeur. Dispositions exceptionnelles jusqu'au 30 avril.</b>	<a href="https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13890">https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13890</a>
-------------------------	--	---

### Recommandations ci-dessous n'ayant pas (encore ?) été mises à jour ces derniers jours.

<b>Recommandation pour la personne surveillée</b>	<p>Si absence de fièvre ou de sensation d'être malade :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Isolement à domicile <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Précisions des modalités de l'isolement à domicile apportées par le professionnel de santé qui a mis en place la surveillance.</li> </ul> </li> </ul> <p>Signe d'alerte nécessitant de contacter immédiatement le centre 15 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fièvre ≥ à 38°C,</li> <li>✓ sensation de fièvre (frissons),</li> <li>✓ syndrome grippal (rhume, mal de gorge),</li> <li>✓ apparition d'une fatigue intense,</li> <li>✓ douleurs musculaires inhabituelles,</li> <li>✓ maux de tête,</li> <li>✓ Mentionner le suivi suite à un contact possible avec une personne malade du nouveau coronavirus,</li> <li>✓ Rester dans une pièce de préférence seule(e) au calme,</li> <li>✓ Eviter tout contact rapproché et garder une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes à proximité.</li> </ul>	<a href="https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations_sui_vi_temperature.pdf">https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations_sui_vi_temperature.pdf</a>
<b>Professionnels de santé</b> classés comme sujets contacts asymptomatiques à <b>risque faible,</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Poursuite de l'activité,</li> <li>↳ Port du masque chirurgical en permanence</li> <li>↳ Auto-surveillance : prise de température 2 fois/j et identification de tout symptôme.</li> <li>↳ En cas de symptômes, même de faible intensité : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ éviction professionnelle immédiate</li> </ul> </li> </ul>	<a href="https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_filiere_ambulatoire_cas_confirmes.pdf">https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_filiere_ambulatoire_cas_confirmes.pdf</a>

<p><b>modéré ou élevé</b> d'un cas confirmé de COVID-19</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ prélèvement à visée diagnostique rapide.</li></ul>	
---	--	--



Thématique	Synthèse	Sources / Supports d'information
<p><b>Suivi du patient à domicile</b></p>	<p>Décision de prise en charge à domicile prise au cours d'une consultation, après recueil du consentement du patient, par le :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Médecin référent infectiologue et/ou médecin hospitalier en lien étroit avec le médecin traitant,</li> <li>↳ Médecin traitant après avis si besoin du médecin infectiologue et/ou du SAMU-centre 15 pour les patients prélevés à domicile,</li> <li>↳ En hospitalisation à domicile</li> </ul> <p>Le suivi régulier du patient est réalisé durant la période symptomatique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Médecin (libéral ou hospitalier)</li> <li>↳ Consultations conventionnelles, appels téléphoniques ou téléconsultations.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Attention particulière à la consultation du début de la deuxième semaine, période où l'on peut constater une aggravation des patients.</li> </ul> </li> </ul> <p>Si mise en place de téléconsultation : examen clinique régulier nécessaire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Alternance de consultations conventionnelles et de téléconsultation en situation épidémique.</li> </ul> <p>Mise en place possible d'un suivi à domicile par un IDEL :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Evaluation régulière de l'évolution de l'état</li> <li>↳ Suivi de la mise en œuvre des précautions et règles d'hygiènes préconisées cf. Annexe 3</li> </ul> <p>En cas d'aggravation : contact immédiat du Centre 15 pour un transfert si nécessaire vers un établissement de santé Covid-19.</p>	<p><a href="https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_filiere_ambulatoire_cas_confirmes.pdf">https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_filiere_ambulatoire_cas_confirmes.pdf</a></p>

Thématique	Synthèse	Sources / Supports d'information
<b>Modalités de prise en charge médicale à domicile</b>	Pharmacie : <ul style="list-style-type: none"><li>↪ Retrait en officine des traitements et produits de santé prescrits par une personne de l'entourage du patient</li><li>↪ Livraison à domicile des traitements,</li><li>↪ Délivrance exceptionnelle par la pharmacie de l'établissement de santé dans lequel a été réalisé la consultation.</li><li>↪ Des masques chirurgicaux peuvent être fournis sur prescription médicale.</li></ul>	<a href="https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_filiere_ambulatoire_cas_confirmes.pdf">https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_filiere_ambulatoire_cas_confirmes.pdf</a>